

Rapid Screening for depression in multiple sclerosis (MS) Schnelles Screening für Depression bei Multipler Sklerose (MS)

(nicht validierte deutsche Version)

Name: _____

Datum: _____

Geburtsdatum: _____

Untersucher: _____

Das Zwei initiale Fragen Screening - Differentialdiagnostik Depression:

1. Haben Sie sich in den letzten 2 Wochen niedergeschlagen, deprimiert oder hoffnungslos gefühlt?
2. Haben Sie in den letzten 2 Wochen wenig Interesse oder Freude daran gehabt, Dinge zu erledigen?



Falls eine oder beide Fragen mit „Ja“ beantwortet werden

Evaluiere Major Depression basieren auf folgenden DSM-IV Kriterien :

Fünf oder mehr der gelisteten neun Symptome waren in den letzten zwei Wochen präsent und waren vorher nicht da. Mindestens ein Symptom ist deprimierte Stimmung, Verlust an Interesse oder Freude.

1. Depressive Stimmung
2. Verlust an Interesse und Freude
3. Signifikanter Gewichtsverlust (ohne Diät) oder Gewichtssteigerung oder verminderter Appetit
4. Schlaflosigkeit oder übermäßige Schläfrigkeit
5. Psychomotorische Unruhe oder Retardierung
6. Fatigue oder Verlust an Energie
7. Gefühl der Wertlosigkeit, Gefühl fehl am Platz zu sein oder Gefühl der übermäßigen Schuld
8. Verminderte Fähigkeit zu denken, sich zu konzentrieren, Gefühl der Unentschlossenheit
9. Wiederkehrende Gedanken an den eigenen Tod oder Selbstmord

Quelle:

DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed.
Reprinted with permission from American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed., text revision. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000:327.



DIGOTOR GbR
Fortbildungen für Orthopädische Medizin und Manuelle Therapie
Austraße 30 · D-74336 Brackenheim

info@digotor.info
www.digotor.info