





International Cartilage Repair Society (ICRS) Evaluationsbogen für Knorpelschäden

ICRS-Grad	Histologie	Behandlung
0	Normal	keine
1a/b	a: Intakte Oberfläche aber Fibrillation und oder Erweichung b: zusätzlich Mikrorisse in der oberflächlichen Knorpelzone 	keine
2	Instabile Knorpelläsionen, die weniger als 50% der Knorpeltiefe einnehmen 	Gute Prognose mit einer Glättung der Ränder ohne eigentliche Behandlung des Schadens
3a/b/c/d	a: >50% der Knorpeltiefe mit intakter kalzifizierter Knorpelzone b: >50% der Knorpeltiefe mit verletzter kalzifizierter Knorpelzone c: >50 der Knorpeltiefe bis zum subchondralen Knochen (Knochenplatte intakt) d: Zusätzlich Blistering (Erhebung auf der Oberfläche) 	Debridement der Wundränder und Behandlung des Schadens: -Abrasion, Drilling, MF, ACT, Mosaik
4	Subchondraler Knochen mit betroffen full thickness, aber keine Osteochondrosis dissecans 	s.o. eventuell Knochentransplantation

Brittberg M. Evaluation of cartilage injuries and repair. The Journal of Bone and Joint Surgery.
2003; 85: 58.

FOMT GbR

Frank Diemer, Volker Sutor und Nedeljko Goreta

Wiesbadener Str. 16

70372 Stuttgart

www.fomt.info, info@fomt.info